

# ISONET® T

Shir. Etsu  
PHEROMONES



Feromone per la lotta contro *Tuta absoluta* in serra su pomodoro, peperone e melanzana con il metodo della confusione sessuale

## COMPOSIZIONE:

Diffusori composti da capillare (E,Z,Z)-3,8,11-tetradecatrien-1-yl acetate  
(E,Z)-3,8-tetradecadien-1-yl acetate  
Totale min 60 mg/dispenser  
Supporto di materiale inerte

## INDICAZIONI DI PERICOLO:

H315: Provoca irritazione cutanea.  
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.



ATTENZIONE



## CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.  
P273: Non disperdere nell'ambiente.  
P280: Indossare guanti e indumenti protettivi.  
P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.  
P332+P313: In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.  
P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito.  
P501: Smaltire il prodotto/recipiente in modo sicuro in conformità alla regolamentazione locale/nazionale.

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:** EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  
SP1: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

## TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE E DISTRIBUTORE:

**CBC** (Europe) S.r.l.

Via E. Majorana, 2 - 20834 Nova Milanese (MB) - Tel: 0362-365079

## PRODOTTO FITOSANITARIO

Autorizzazione Ministero della Salute n. 16510 del 20/01/2016

## PRODOTTO DA:

Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. 2-6-1 Ohtemachi Chiyoda-ku Tokyo

**CONTENUTO NETTO:** 100 diffusori

## ISTRUZIONI PER L'USO

predisporre una strategia combinata con insetticidi. Soprattutto all'inizio del ciclo della coltura in serra predisporre trattamenti abbattenti per ridurre le popolazioni e combinare gli effetti per un migliore controllo. L'uso di insetticidi non pregiudica il funzionamento dei diffusori, è quindi possibile intervenire in qualsiasi momento. Femmine fecondate provenienti da serre vicini o da altre fonti di infestazione possono causare danni non previsti. Adottare tutte le buone pratiche agronomiche atte a ridurre le popolazioni del fitofago. Ispezionare periodicamente i frutti per verificare eventuali attacchi ed intervenire con insetticidi dove e quando necessario.

**CONTROLLI:** Le trappole di monitoraggio devono essere posizionate all'interno delle serre trattate con il metodo della confusione (almeno 2 trappole per serra, in relazione alle dimensioni della serra). Le trappole devono essere collocate ad un'altezza di circa 0,5 - 1 m. Le trappole devono essere ispezionate almeno ogni 2-3 giorni (almeno 2 volte/settimana).

**CONSERVAZIONE:** Nell'imballo originale ed a temperatura non superiore a 5 °C il prodotto si conserva per 2 anni.

**ATTENZIONE:** Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo. Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Non applicare con mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 30/07/2018.

**BIOGARD®**  
biological First.

Rev. 07-2018

