

# TRATON<sup>®</sup> SX



## Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di frumento tenero, duro ed orzo



**Caratteristiche:** Traton SX viene rapidamente assorbito da foglie e radici e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate; subito dopo l'assorbimento, Traton SX blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 2 settimane dall'applicazione. Le malerbe non devitalizzate sono drasticamente ridotte nello sviluppo e sono molto meno competitive nei riguardi della coltura. Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono la velocità di azione.

**Composizione:** Tribenuron metile puro 22,2 g - Metsulfuron metile puro 11,1 g

**Miscibilità:** Compatibile con MCPA, dicamba, bromoxinil ottanoato, carfentrazone etile, fluroxipyr, fenoxaprop-p-etile, clodinafop-propargil.

**Registrazione:** N° 12642 del 17-06-2008

**Formulazione:** SG - Granuli solubili

<b>Indicazioni di pericolo CLP</b>  ATTENZIONE <b>Frasi H</b> H410, EUH208, EUH401		<b>Confezioni</b> Barattolo 70 g 
<b>Gruppo HRAC</b> B	<b>Marchio registrato</b> E.I. Du Pont de Nemours	<b>Titolare registrazione</b> E.I. Du Pont de Nemours
<b>Gruppo imballaggio</b> III	<b>Trasporto ONU</b> 3077	<b>Classificazione ADR</b> 9

### Colture (intervallo di sicurezza)

Frumento tenero,  
Frumento duro, Orzo

### Avversità controllate

**Infestanti sensibili:** Adonide (*Adonis aestivalis*), Arabetta comune (*Arabidopsis thaliana*), Aspraggine (*Pichris echinoides*), Billeri (*Cardamine hirsuta*) Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Cappellini dei campi (*Apera spica venti*), Centocchio (*Stellaria media*), Coriandolo (*Bifora radians*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Crisantemo delle messi (*Chrisantemum segetum*), Erba ruota (*Lamium amplexicaule*), Falsa ortica (*Lamium purpureum*), Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Geranio (*Geranium dissectum*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Poligono convolvolo (*Polygonum convolvulus*), Ranuncolo (*Ranunculus acer*), Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Romice (*Rumex* sp.), Stafisagria (*Delphinium staphysagria*), Stoppione (*Cirsium* sp.), Viola (*Viola arvensis*)  
**Infestanti mediamente sensibili:** Fumaria (*Fumaria officinalis*), Veronica (*Veronica persica*), Vilucchio comune (*Convolvulus arvensis*)

### Dosi

35 g/ha, addizionato ad un bagnante non ionico alla relativa dose di etichetta, da distribuire in 200-400 litri d'acqua

### Modalità d'impiego

Utilizzare in post-emergenza dallo stadio delle tre foglie fino allo stadio di botticella della coltura.

**Indicazioni per il corretto impiego** - In presenza di popolazioni di erbe infestanti resistenti agli erbicidi ALS-inibitori, Traton SX deve essere miscelato con erbicidi aventi differente meccanismo d'azione. Applicare una fascia tampone di 5 metri tra le aree trattate e le antistanti aree non trattate. Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Dopo un trattamento con Traton SX si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.