

VALIS M

GRANULI IDRODISPERSIBILI (WG)

Fungicida sistemico e di copertura
MECCANISMO D'AZIONE FRAC 40 + M3

Composizione(riferita a g 100):
Valifenalate (IR5885) puro g. 6
Mancozeb puro g. 60
Coformulanti q.b. a g. 100



Belchim Crop Protection Italia S.p.A.
Viale Milanofiori, Strada 6, Palazzo N3
20089 Rozzano (MI) - Tel. 02 33599422

Officina di produzione:
S.T.I. Solfotecnica Italiana SpA
via Evangelista Torricelli 2
48010 Cotignola (Ravenna)

Registrazione Ministero della Salute
n° 014819 del 25/05/2012

Taglie: **0,5-1-5-10-20 Kg** Partita n°.....

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H361d Sospettato di nuocere al feto. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso.

REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



ATTENZIONE

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Attenzione: evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso comunque esposte.

Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da corpi idrici superficiali in caso di applicazione su patata, pomodoro e cipolla, di 10 metri in caso di applicazione su vite. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
VALIFENALATE 6% e MANCOZEB 60% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

VALIFENALATE: Sintomi: nessuno

MANCOZEB: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiche, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporefflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o peggiorata assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

VALIS M contiene 6% di Valifenalate (nome ISO proposto) e 60% di Mancozeb. VALIS M è un nuovo fungicida sistemico per il controllo dei danni causati da differenti specie di Oomiceti. Valifenalate mostra proprietà preventive, curative, eradicanti e antisporulanti. Mancozeb è un fungicida di contatto effi cace contro una vasta gamma di agenti patogeni fungini.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Applicare VALIS M secondo le indicazioni riportate sotto. VALIS M è da utilizzarsi mediante applicazioni fogliari in un programma di controllo preventivo.

VITE (per esclusivo impiego in campo)

Peronospora (*Plasmopara viticola*): 2 kg/ha

Effettuare il trattamento quando compaiono i primi sintomi dell'infezione primaria. Le applicazioni successive devono essere eseguite ad un intervallo di 10-12 giorni. Effettuare al massimo tre applicazioni per anno.

PATATA (per esclusivo impiego in campo)

Peronospora (*Phytophthora infestans*) 2.5 kg/ha

Iniziare il trattamento quando si verificano le condizioni favorevoli alla malattia. I successivi trattamenti si eseguiranno alla cadenza di 7-10 giorni l'uno dall'altro. Effettuare al massimo tre applicazioni per anno.

POMODORO (per esclusivo impiego in campo)

Peronospora (*Phytophthora infestans*) 2.5 kg/ha

Iniziare il trattamento quando si verificano le condizioni favorevoli alla malattia. I successivi trattamenti si eseguiranno alla cadenza di 7-10 giorni l'uno dall'altro. Effettuare al massimo tre applicazioni per anno.

CIPOLLA (per esclusivo impiego in campo)

Peronospora (*Peronospora destructor*) 2.5 kg/ha

Iniziare il trattamento quando si verificano le condizioni favorevoli alla malattia. I successivi trattamenti si eseguiranno alla cadenza di 7 giorni l'uno dall'altro. Effettuare al massimo tre applicazioni per anno.

PREPARAZIONE DELLA SOSPENSIONE

Non preparare una miscela in quantità superiore a quella necessaria per l'applicazione immediata. Versare il prodotto nel serbatoio riempito a metà di acqua, con l'agitatore attivato. Versare eventuali altri prodotti e farli disperdere completamente. Portare la botte a volume. La quantità d'acqua necessaria per ettaro varierà in base allo stadio di crescita della coltura e all'apparecchiatura utilizzata. Applicare la miscela entro 2 ore dalla sua preparazione.

COMPATIBILITÀ

In caso di miscela con altri formulati si consiglia una prova di miscelazione su scala ridotta prima di effettuare la miscela nella botte.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verifichi caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Applicato alle dosi raccomandate non ha mostrato effetti fitotossici.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI secondo le seguenti indicazioni

Vite/Cipolla: 28 giorni prima del raccolto

Patata: 7 giorni prima del raccolto

Pomodoro: 5 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
AGITARE PRIMA DELL'USO