

# DYNALI®

Concentrato disperdibile.

Fungicida ad azione preventiva per la lotta contro oidio, marciume nero e rossore parassitario della vite.

## Composizione

100 g di prodotto contengono:

difenoconazolo puro	g 5.6 (60 g/l)
cyflufenamid puro	g 2.8 (30 g/l)
coformulanti q.b. a	g 100
contiene poliarilfenil etere fosfato e poliarilfenolo etossilato	



ATTENZIONE

## INDICAZIONI DI PERICOLO

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

## CONSIGLI DI PRUDENZA

Non disperdere nell'ambiente. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

## SYNGENTA ITALIA S.p.A.

Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

### Stabilimento di produzione:

Syngenta Crop Protection Monthey SA - Route de l'Ile au Bois  
CH-1870 Monthey - Switzerland

Registrazione Ministero della Salute n. 15263 del 27.03.2013

Partita n. vedi corpo della confezione

11

### Altri stabilimento di produzione:

- Phyteurop BP 27, ZI de Champagne, 49 260 Montreuil Bellay, FRANCE
- S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)
- ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)

Altre taglie: ml 250- 325- 350- 500- 650; l 1,3 - 2 - 4 - 5 - 10

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

## PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere gli organismi invertebrati acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri dai corpi idrici superficiali.

## INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

difenoconazolo puro	g 5.6 (60 g/l)
cyflufenamid puro	g 2.8 (30 g/l)

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:  
**DIFENOCONAZOLO - Sintomi:** organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.

Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).

Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.

Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.

In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.

Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.

Terapia sintomatica.

**CYFLUFENAMID: Terapia sintomatica.**  
Consultare un Centro Antiveneni.

## Caratteristiche

Dynali è un fungicida basato sulla combinazione di due sostanze attive a diverso meccanismo di azione: difenoconazolo e cyflufenamid, appartenenti alle famiglie chimiche dei triazoli e delle amidossime.

Dynali, grazie al movimento translaminare e all'attività in fase di vapore, è in grado di proteggere foglie e grappoli dagli attacchi di oidio, marciume nero e rossore parassitario. Dynali va applicato preventivamente prima della comparsa dei sintomi della malattia.

## Dosi e modalità d'impiego

Colture	Parassiti	Dose/hl	Dose/ha	Applicazione
VITE (pieno campo)	Oidio ( <i>Erysiphe necator</i> ) Marciume nero – Black rot ( <i>Guignardia bidwellii</i> ) Rossore parassitario-Rot brenner ( <i>Pseudopezicula tracheiphila</i> )	65 ml/hl	0.65 l/ha	2 trattamenti ad intervallo di 10-12 giorni a partire dallo stadio di 3 foglie

Utilizzare la dose di 65 ml/hl utilizzando attrezzature a volume normale e volumi di irrorazione di 1000 l/ha.

Con volumi di irrorazione inferiori a 1000 l/ha (es. attrezzature a basso/ultrabasso volume), mantenere inalterata la dose di 0,65 l/ha, aumentando di conseguenza la dose/hl utilizzata (fino ad un massimo di 325 ml/hl nel caso di utilizzo di un volume di acqua pari a 200 l/ha).

Adattare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura delle colture trattate, evitando lo sgocciolamento della vegetazione.

**“Avvertenza”** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

**Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta.**

## ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Operare in assenza di vento.

Da non venderli sfuso.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con D.D. del 27 marzo 2014 e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 1° ottobre 2014