



UPL Italia srl
Via Terni 275
47522 Cesena (Italy)
0547 661523

upl-ltd.com/it
info@uplitalia.com

Cesena, 15 Maggio 2020

Gentile cliente,

la presente per comunicarLe che in data 14 Maggio 2020 il Ministero della Salute ha autorizzato l'uso in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria – ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1107/2009 – del prodotto fitosanitario **PENNZOZEB DG (reg. n. 4199)**, contenente la sostanza attiva **Mancozeb**, per l'estensione di impiego su barbabietola da zucchero (coltura già autorizzata) con modifica delle dosi e del numero di trattamenti per il controllo della *Cercospora*, come sotto riportato.

Tale autorizzazione è valida **dal 14 Maggio 2020 al 10 Settembre 2020**.

Coltura	Malattia	Dose	Volume d'acqua l/ha	N° max di trattamenti anno	Tempo di carenza giorni
Barbabietola da zucchero	Cercospora (<i>Cercospora beticola</i>)	2.7 kg/ha	200-600	4	28

Le confezioni di prodotto esistenti in commercio possono essere impiegate, a patto che il rivenditore fornisca all'utilizzatore una copia cartacea della nuova etichetta all'atto della consegna della merce (è sufficiente una copia allegata ad ogni bolla di consegna) e l'utilizzatore conservi tale copia fra i propri documenti a supporto di eventuali future verifiche da parte delle autorità preposte.

Si allega alla presente comunicazione copia dell'etichetta autorizzata.

Cordiali saluti

UPL Italia srl

PENNZOZEB® DG

ANTICRITTOGAMICO AD USO AGRICOLO IN GRANULI DISPERSIBILI

PENNZOZEB® DG COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
MANCOZEB puro g 75
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene: hexamethylenetetramine

Indicazioni di pericolo

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea –
H319 – Provoca grave irritazione oculare - H361d
Sospettato di nuocere al feto – H410 Molto tossico per
gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Consigli di Prudenza

P201 Procurarsi le istruzioni prima dell'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.
P280 Proteggere gli occhi/il viso. P261 Non respirare i vapori di nebulizzazione
P308+P313 In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un
medico. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un
medico. P362+P364 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di
indossarli nuovamente. P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli
nuovamente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il
prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale sui rifiuti
pericolosi

Informazioni supplementari sui pericoli

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le
istruzioni per l'uso

Titolare dell'autorizzazione:

UPL EUROPE Ltd.

The Centre, Birchwood Park, Warrington WA3 6YN, Gran Bretagna - tel. +44 1925 819999

Distribuito da:

UPL ITALIA S.r.l. – S. Carlo di Cesena (FC)

Officine di produzione: CEREXAGRI B.V. P.O. Box 6030 - 3196 Rotterdam (NL) - **UPL Ltd. – 11 G.I.D.G**
VAPI – 396 195 Dist: Valsad India - **UPL Ltd. – Plot 3405/06 GIDC Ankleshwar 393002 Gujarat India - UPL**
Ltd. – Jhagadia Dist. Bharuch (India) - Arysta Lifescience Ougrée Production SPRL – Ougrée (Belgio) -
UPL Europe Ltd. – Sandbach, Cheshire CW11 3QQ (UK)

Officine di confezionamento: TORRE S.r.l. – Torrenieri - frazione di Montalcino (SI) – **S.T.I.**
SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. – Cotignola (RA) - DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA – Caravaggio (BG)

Stabilimento di rietichettatura: **ARCO Logistica S.r.l. – Via A. Battistella, 22 - 44123 Ferrara**

Registrazione del Ministero della Sanità N. 4199 del 17/02/1981

Contenuto netto: kg 1 - 1,7 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25

PARTITA N°del.....

TELEFONO DI EMERGENZA: Tel. 00 44 (0) 208 762 8322

ATTENZIONE



Prescrizioni supplementari

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Effettuare il rientro in campo soltanto dopo la completa asciugatura della soluzione applicata.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio nell'uso su agrumi e noce, rispettare una fascia di sicurezza non trattata da zone non coltivate pari a: 5 m con attrezzature a riduzione di deriva del 90%, 10 m con attrezzature a riduzione di deriva del 75%, 15 m con attrezzature a riduzione di deriva del 50%, oppure 20 m con normali attrezzature.

Per proteggere gli organismi acquatici per l'uso su:

Noce: rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 10 m con attrezzature a riduzione di deriva del 90%, 15 m con attrezzature a riduzione di deriva del 75%, 20 m con attrezzature a riduzione di deriva del 50%, oppure 30 m con normali attrezzature

Agrumi: rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 15 m con attrezzature a riduzione di deriva del 90%, 20 m con attrezzature a riduzione di deriva del 75%, 30 m con attrezzature a riduzione di deriva del 50%

Barbabetola: rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 3 m con attrezzature a riduzione di deriva del 50%, oppure 5 m con normali attrezzature.

Per proteggere gli organismi acquatici utilizzare ugelli con riduzione di deriva del 90% o rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:

- 30 metri da corpi idrici superficiali per melo, pero e olivo;

- 12 metri da corpi idrici superficiali per vite;

- 3 metri da corpi idrici superficiali per patata, pomodoro, melanzana, ortaggi a bulbo, frumento, fagioli, barbabetola da zucchero e per floricoltura

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.

Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveneni.

MODALITÀ E CAMPI DI IMPIEGO

PENNZOZEB® D.G. è un prodotto di tipo preventivo ad ampio spettro d'azione. Può essere impiegato sulle seguenti colture:

coltura	malattie	dose g/ha	volume d'acqua l/ha	n° max trattamenti anno	tempo di carenza giorni
Pomacee (melo e pero)	Ticchiolatura (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pirina</i>), Maculatura bruna (<i>Stemphylium vesicarium</i>), Septoria (<i>Mycosphaerella sentina</i>), <i>Alternaria (Alternaria sp.)</i>	150-250	500-1200	2	28
Drupacee (pesco, nettarino, susino, albicocco, ciliegio)	Bolla (<i>Taphrina deformans</i>), Monilia (<i>Monilia sp.</i>) (effetto collaterale) Batteriosi (<i>Xanthomonas spp.</i> , <i>Pseudomonas spp.</i>)	210	500-1000	4	30
Noce	Antracnosi (<i>Gnomonia leptostyla</i>)	210	500-1000	4	45
Agrumi (arancio, limone, lime, mandarino, satsuma, clementino)	Antracnosi (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>), <i>Alternaria (Alternaria spp.)</i>	320	500-1000	1	14
Olivo	Occhio di pavone (<i>Spilocaea oleagina</i>), Antracnosi (<i>Gleosporium olivarum</i>), Fumaggine (<i>Capnodium oleophilum</i> , etc.)	260-320	500-1000	1	21
Vite da vino e tavola	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>), Escoriosi (<i>Phomopsis viticola</i>), Antracnosi (<i>Sphaeloma ampelinum</i>), Marciume nero (<i>Guignardia bidwellii</i>)	200-250	200-1000	6 (vite da vino) 4 (vite da tavola)	28
Vivai di vite	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>), Escoriosi (<i>Phomopsis viticola</i>), Antracnosi (<i>Sphaeloma ampelinum</i>), Marciume nero (<i>Guignardia bidwellii</i>)	200-250	200-1000	6 (vite da vino) 4 (vite da tavola)	--
Pomodoro	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>), <i>Alternaria (Alternaria sp.)</i> , Septoria (<i>Septoria lycopersici</i>), Cladosporiosi (<i>Cladosporium fulvum</i>)	150-210	500-1000	5	3
Melanzana	<i>Alternaria (Alternaria sp.)</i>	210	500-1000	5	3

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14 maggio 2020

(*) Impiego su barbabetola (aumento di dose) autorizzato con decreto dirigenziale del 14 maggio 2020 con validità dal 14 maggio 2020 al 10 settembre 2020

coltura	malattie	dose g/ha	volume d'acqua l/ha	n° max trattamenti anno	tempo di carenza giorni
Patata	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>), Alternaria (<i>Alternaria solani</i>)	210	500-1000	8	7
Peperone	Peronospora (<i>Phytophthora capsici</i>)	210	500-1000	4	3
Melone, cocomero	Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	210	500-1000	4	3
Cetriolo, zucchino	Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	210	500-1000	4	3
Aglio, Cipolla	Peronospora (<i>Peronospora destructor</i> , <i>Phytophthora porri</i>), Ruggine (<i>Puccinia</i> sp.), Alternaria (<i>Alternaria porri</i>)	210	500-1000	4	28
Carota	Alternaria (<i>Alternaria dauci</i>)	210	500-1000	4	30
Cavolo broccolo, Cavolfiore	Peronospora (<i>Peronospora brassicae</i>), Alternaria (<i>Alternaria</i> sp.)	210	500-1000	4	30
Lattughe	Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>)	210	200-1000	4	28
Fagiolo	Ruggine (<i>Uromyces appendiculatus</i>), peronospora (<i>Phytophthora phaseoli</i>), Antracnosi (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>), Alternaria (<i>Alternaria</i> sp.)	210	200-1000	2	21
Pisello	Peronospora (<i>Peronospora pisi</i>), Antracnosi (<i>Ascochyta pisi</i>), Alternaria (<i>Alternaria</i> sp.)	210	200-1000	1	21
Asparago	Ruggine (<i>Puccinia asparagi</i>)	2,1 kg/ha	200-1000	4	-
Barbabietola da zucchero *	Cercospora (<i>Cercospora beticola</i>)	2,7 kg/ha	200-600	4	28
Frumento	Septoria (<i>Septoria tritici</i>)	2,1 kg/ha	200-800	2	28
	Ruggine (<i>Puccinia</i> sp.)				
Pioppo	Bronzatura (<i>Marssonina brunnea</i>)	400-500	-	-	-
Garofano	Ruggine (<i>Uromyces</i> sp., <i>Puccinia</i> sp., <i>Phragmidium</i> sp.)	200-250	-	3	-
Rosa	Peronospora (<i>Diplocarpon rosae</i>)	200-250	-	3	-

Per olivo e agrumi dose massima 3,2 Kg/ha, per tutte le altre colture dose massima di 2,1 Kg/ha, eccetto la barbabietola da zucchero* la cui dose massima di 2,7 kg/ha è autorizzata in deroga nel periodo riferito in calce all'etichetta.

Per pomodoro, melanzana, peperone, patata e rosa iniziare i trattamenti quando le condizioni meteorologiche siano favorevoli all'insediamento dei patogeni. Ripetere le applicazioni ogni 7-10 giorni.

Per aglio e cipolla iniziare i trattamenti quando le piante abbiano raggiunto lo stadio di 3-4 foglie vere. Porre particolare attenzione al periodo di formazione dei bulbi. Nelle colture da seme continuare i trattamenti fino alla raccolta. Usare preferibilmente un basso volume di irrorazione.

Per la carota iniziare i trattamenti quando le piante raggiungano un'altezza di 7-9 cm.

Per cavolo broccolo e cavolfiore iniziare i trattamenti quando le condizioni meteorologiche siano favorevoli all'insediamento dei patogeni. Non eseguire più di 2 interventi con fungicidi contenenti ditiocarbammati dopo l'inizio della formazione delle infiorescenze.

Per il fagiolo eseguire il primo trattamento alla comparsa della prima foglia composta e il secondo alla comparsa degli abbozzi fiorali.

Per l'asparago iniziare i trattamenti dopo la raccolta dei turioni (parte edibile), quando le condizioni meteorologiche siano favorevoli all'insediamento dei patogeni. Ripetere le applicazioni ogni 7-10 giorni.

Per il frumento, contro Septoria, miscela con altri principi attivi (triazoli, strobilurine, SDHI, ecc.) per la gestione delle resistenze.

Per l'impiego su pesco, nettarino e albicocco contro Batteriosi iniziare i trattamenti durante il periodo di fioritura.

(*) Per la dose ed il numero di applicazioni su barbabietola da zucchero contro Cercospora si faccia riferimento in calce all'etichetta per il relativo periodo di autorizzazione in deroga. Le foglie di barbabietola da zucchero non devono essere destinate all'alimentazione animale.

PENNZOZEB® DG si impiega versando il prodotto direttamente nella botte riempita per ¾ con acqua con l'agitatore in funzione; aggiungere poi il rimanente quantitativo di acqua.

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di PENNZOZEB® DG con altri prodotti fitosanitari. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto è fitotossico per le seguenti cultivar di pero: Abate Fetel, Armella, Butirra,

Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil bianca, Gentilona, Spadona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpì, Zecchermannà.

ATTENZIONE!

- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
- Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.
- Divieto d'impiego in serra
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Non applicare con mezzi aerei
- Da non vendersi sfuso
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
- Operare in assenza di vento
- Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego
- Il contenitore non può essere riutilizzato
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente