

# MASAI® 20 WP

## ACARICIDA

### POLVERE BAGNABILE (WP)

#### MASAI® 20 WP COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:  
TEBUFENPIRAD puro g 20  
Coformulanti inerti q.b. a g 100  
Contiene TEBUFENPIRAD: può provocare una reazione allergica.  
Contiene: SODIO DODECIL SOLFATO

#### INDICAZIONI DI PERICOLO

Nocivo se inalato. Nocivo se ingerito. Può irritare le vie respiratorie. Può provocare danni agli organi (tratto gastrointestinale) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (orale). Molto tossico per gli organismi acquatici. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**

#### CONSIGLI DI PRUDENZA

Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Non respirare la polvere/i gas/la nebbia/i vapori. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Dopo la manipolazione lavare accuratamente le parti del corpo contaminate. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. **IN CASO DI INALAZIONE:** trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. **IN CASO DI INGESTIONE:** sciacquare la bocca. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ventilato. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

**BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8  
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1**

#### PRODOTTO FITOSANITARIO

Registrazione del Ministero della Sanità n. 8937 del 01.10.1996

#### Officine di produzione

SIPCAM S.p.A. - V.le V.Veneto, 81 - 26857 Salerano sul Lambro (LO)  
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.- Via E. Torricelli, 2 - 48010 Cotignola (RA)

**Contenuto netto:** g 50 - g 100 - g 500 - kg 1

**Sacchetti idrosolubili:** g 100  
g 500 (10 sacchetti da g 50)  
g 500 (5 sacchetti da g 100)  
kg 1 (10 sacchetti da g 100)

#### Partita n.

© Marchio Registrato

**NORME PRECAUZIONALI:** Durante la fase di miscelazione e caricamento, indossare tuta da lavoro, guanti e protezione respiratoria (FFP2/P2). Durante l'applicazione, indossare guanti, stivali di sicurezza, tuta protettiva con cappuccio e visiera protettiva per il viso. Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta. Per effettuare la raccolta manuale dell'uva, indossare i guanti.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di:

**30 metri** per pesche, nettarine, susino;

**20 metri** per agrumi, mele e pere;

**10 metri** per la vite, applicazioni tardive;

**5 metri** per cetriolo, cetriolino, zucchini.

Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il

materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:** Sintomi (dedotti dagli esperimenti su animali): per ingestione si osserva depressione SNC con atassia, ma anche eccitazione con tremori muscolari e convulsioni cloniche; inoltre azione gastrica diretta, con vomito e diarrea, e disturbi alla respirazione. - **Terapia:** sintomatica. **Attenzione: consultare un Centro Antiveleli.**

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**CARATTERISTICHE:** MASAI 20 WP è un acaricida che agisce per ingestione e contatto nei confronti di tutte le forme mobili degli acari fitofagi, esplicando un immediato effetto abbattente ed una marcata efficacia residua, tali da consentire nella maggior parte dei casi anche solo un unico trattamento risolutivo per l'intera stagione. MASAI 20 WP è dotato di attività translaminare e la sua azione non è influenzata dalla temperatura.

**MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO.** MASAI 20 WP è consigliato per la lotta contro acari fitofagi indicati nella tabella sottostante che infestano le colture riportate nella stessa.

**Effettuare un solo trattamento all'anno.**

Coltura	Malattia	Dose kg/ha
Pomacee	<i>Panonychus ulmi</i> , <i>Tetranychus urticae</i>	0,50
Drupacee (pesco, nettarino)	<i>Panonychus ulmi</i> , <i>Tetranychus urticae</i>	0,65
Susino	<i>Panonychus ulmi</i> , <i>Tetranychus urticae</i>	0,50
Agrumi	<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus citri</i> , <i>Eotetranychus banksi</i>	1,00
Vite	<i>Panonychus ulmi</i> , <i>Eotetranychus carpini</i> , <i>Tetranychus urticae</i> , <i>Calepitrimerus vitis</i>	0,50
Pomodoro e melanzana (serra)	<i>Tetranychus urticae</i>	1,00
Cetriolo, cetriolino, zucchini (pieno campo e serra)	<i>Tetranychus urticae</i>	1,00
Melone e cocomero (serra)	<i>Tetranychus urticae</i>	1,00
Fragola (serra)	<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Steneotarsonemus pallidus</i>	1,00

Per sfruttare al meglio le caratteristiche di MASAI 20 WP è preferibile intervenire, in linea generale, ad inizio infestazione. Nei programmi di "lotta guidata" si consiglia di effettuare i trattamenti con MASAI 20 WP al raggiungimento della soglia economica d'intervento ed una sola volta per stagione. Impiegare volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione. Per trattamenti con irroratrici a ultra basso volume (ULV) effettuare saggi preliminari di selettività.

**PREPARAZIONE DELLA MISCELA:** Stemperare, mediante agitazione, la giusta dose di prodotto in metà acqua rispetto alla quantità necessaria per ottenere la concentrazione voluta; quindi, sempre continuando ad agitare, aggiungere la rimanenza fino a volume completo ed iniziare il trattamento.

**COMPATIBILITA':** MASAI 20 WP è risultato compatibile, sia fisicamente che per quanto riguarda efficacia e sicurezza di impiego, con i più diffusi prodotti insetticidi e fungicidi in commercio al momento della sua registrazione. Esso deve comunque venir diluito in acqua prima di qualunque altro prodotto con cui si misceli. Si sconsiglia l'uso insieme a prodotti aventi forte reazione alcalina.

**FITOTOSSICITA'.** MASAI 20 WP dimostra di essere selettivo sulle colture raccomandate quando l'uso avviene secondo le istruzioni della presente etichetta. Nel caso di impiego su varietà di recente costituzione, in particolar modo in serra, la buona pratica agricola comunque consiglia di effettuare un saggio preliminare la prima volta che viene usato un prodotto nuovo, trattando poche piante ed accertandosi che nelle condizioni specifiche non si verifichino inconvenienti.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta osservando i seguenti intervalli: 21 GIORNI per le Susine; 14 GIORNI per Uva, Pesche, Nettarine; 7 GIORNI per Mele, Pere, Agrumi; 3 GIORNI per Pomodori, Melanzane, Cetrioli, Cetriolini, Zucchine, Fragole, Meloni e Angurie.

**ATTENZIONE** - Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non venderci sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta adeguata ai sensi del D.D. emesso in data 28.11.2017